



ПОРЯДОК основной (первичной), бустерной и повторной (сезонной) ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ COVID-19

ОСНОВНАЯ (ПЕРВИЧНАЯ) ВАКЦИНАЦИЯ против COVID-19 – это курс вакцинации в соответствии с инструкцией к иммунобиологическому лекарственному препарату, проводимый пациенту впервые, может состоять из одной (СПУТНИК ЛАЙТ) или двух доз (Гам-КОВИД-Вак, SINOPHARM) вакцины.

В настоящее время при вакцинации используются следующие иммунобиологические лекарственные препараты (вакцины):

- ▶ лекарственный препарат СПУТНИК ЛАЙТ векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – СПУТНИК ЛАЙТ);
- ▶ лекарственный препарат Гам-КОВИД-Вак комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 (далее – Гам-КОВИД-Вак);
- ▶ лекарственный препарат COVID-19 Vaccine (Vero Cell) Inactivated (далее – SINOPHARM).

В целях поддержания устойчивого иммунного ответа целесообразно проведение бустерной вакцинации и повторной (сезонной) вакцинации

БУСТЕРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ против COVID-19 – это вакцинация, проводимая пациенту через 6 и более месяцев после основной (первичной) вакцинации.

ПОВТОРНАЯ (СЕЗОННАЯ) ВАКЦИНАЦИЯ против COVID-19 – курс вакцинации, проводимый пациенту через 12 месяцев после основной (первичной) или бустерной вакцинации.

БУСТЕРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Бустерная вакцинация против COVID-19 с использованием вакцины СПУТНИК ЛАЙТ проводится **через 6 и более месяцев после основной (первичной)** вакцинации, проведенной любой вакциной:

- ▶ лицам в возрасте 18-25 лет (студенты, курсанты и учащиеся очной формы обучения учреждений профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, лица, переболевшие инфекцией COVID-19 и другие);
- ▶ лицам в возрасте 18 лет и старше, в том числе лицам с ослабленным иммунитетом, лицам старше 60 лет, лицам, принимающим иммуносупрессивную терапию, находящимся на гемодиализе, медицинским работникам, работникам стационарных учреждений социального обслуживания, лицам, переболевшим инфекцией COVID-19.

ПОВТОРНАЯ (СЕЗОННАЯ) ВАКЦИНАЦИЯ

Повторная (сезонная) вакцинация лицам 18 лет и старше проводится **через 12 месяцев после** бустерной вакцинации и после основной (первичной) вакцинации (лицам, не получившим бустерную вакцинацию) с использованием Гам-КОВИД-Вак (СПУТНИК V), или СПУТНИК ЛАЙТ, или SINOPHARM, или иного иммунобиологического лекарственного препарата.

